

※ 복용전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

정부공인 KGMP
적격업체제품

일반의약품
분류번호 : 119

페리시정

(세인트존스워드50%에탄올엑스)

【성분·함량】 1정 중

세인트존스워드50%에탄올엑스(KPC) 250mg
(히페리신으로서 0.05mg 이상)

첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 4호

【성 상】 원형의 연한 녹색의 필름코팅정제

【효능·효과】 경도의 우울증, 무력증, 내재적 피로감, 흥분, 긴장상태, 수면이상(잠들기와 잠에서 깨어나기 어려움)

【용법·용량】

성인 1일 2회, 아침·저녁 각 1정씩 식사 중 또는 식후에 약간의 물과 함께 복용한다. 이 제제는 효과가 나타나기까지 적어도 14일간 복용해야 한다.

권장치료기간 : 4~6주

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 성분에 과민한 환자
- 2) 중증의 우울증 환자
- 3) 기지의 피부 광과민성 환자
- 4) 임부 및 수유부 (사용경험이 충분하지 않다.)
- 5) 다음 약물을 투여하고 있는 환자
 - ① 면역억제제(사이클로스포린, 타크로리무스)
 - ② HIV 프로테아제 저해제(인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르 등)
 - ③ 세포중식 억제제(이리노테칸, 사이클로포스파마이드, 타목시펜, 탁솔, 에토포시드 등)
 - ④ 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트립틸린, 시탈로프라, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 설프랄린, 네파조돈 등) : 이러한 약물과 병용시 구역, 구토, 불안, 안절부절, 혼란이 나타나는 등 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 이상반응

- 1) 드물게, 특히 피부색이 옅은 사람에서 피부 발적(광과민성)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 2) 드물게 피로, 불안, 졸음, 초조, 피부 알레르기 반응(붉어짐, 가려움), 위장관장애가 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 만일 약물 등에 알려지가 있다면 또는 해당 질환을 위해 다른 약제를 복용하고 있다면 의사나 약사에게 알릴 것.
- 2) 만일 이 약의 효과가 너무 강하거나 너무 약하다고 생각되면 의사나 약사에게 상의할 것.
- 3) 이 약 투여시 강한 자외선에 노출(장시간의 일광욕, 고도의 일광)되는 것을 피할 것

5. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로 이 효소에 의해 대사되는 다음 의약품의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 의약품과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용시는 이상반응 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.

- 1) 항레트로바이러스약(에파비렌즈, 네비라핀, 데라비리딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 질시타빈 등)과 병용시 이러한 항레트로바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발생할 수 있다.
- 2) 쿠마린계 항응고제(펜프로쿰, 와파린 등), 강심약(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 골린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오다론, 퀴니딘, 디스피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항경련약(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 진정수면제(미다졸람)와 병용시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
- 3) 경구용 피임제(에치닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에치스테론, 레보노르게스트렐 등)와 병용시 경구용 피임제의 효능 감소 및 부정성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
- 4) 편두통치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여 : 임부 및 수유부에 대한 충분한 사용경험이 없으므로 투여하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 30정, 200정

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

<이 첨부서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

최종작성일자 : 2012. 04. 16



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 경제로 59
문의전화: (080)780-1931